



Unitatea/Compartimentul de Primiri Urgențe \_\_\_\_\_

Numele și prenumele pacientului \_\_\_\_\_

Medic curant \_\_\_\_\_

Data administrării tratamentului \_\_\_\_\_

Diagnostic \_\_\_\_\_

Tratament primit (laborator, radiografii, EKG, medicamente incluzând pe cele recomandate la plecare)

Ați fost tratat în Unitatea/Compartimentul de Primiri Urgențe (Serviciul de Urgență) astăzi și medicul care v-a consultat consideră că sunteți îndeajuns de bine pentru a fi lăsat acasă. Vă rugăm să fiți totuși conștient de faptul că, ocazional, în ciuda unui tratament corect administrat, starea pacientului se poate agrava. Din acest motiv:

**Dacă prezentați orice alt nou simptom sau dacă simptomele dumneavoastră durează mai mult decât ați fost informat de către medic, adresați-vă medicului de familie/specialist sau reveniți imediat în Serviciul de Urgență.**

Altfel, continuați să fiți urmărit de către medicul \_\_\_\_\_

în 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 zile / săptămâni / luni / după cum v-a fost indicat.

Vă rugăm să aduceți aceste recomandări la următoarea întâlnire cu medicul dumneavoastră de familie/specialist.

\_\_\_\_\_  
Semnătura de primire (pacient sau aparținător)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Nume și prenume (pacient sau aparținător)





## Recomandări pentru pacienți și aparținători

# DUREREA ABDOMINALĂ

Medicul care a examinat copilul dumneavoastră nu a identificat o cauză gravă de durere abdominală și a considerat că poate pleca acasă. Cele mai multe cazuri de durere abdominală consultate în Serviciul de Urgență se ameliorează în 24 de ore. În orice caz, este important să realizați că anumite afecțiuni (precum apendicita) pot fi diagnosticate cu dificultate în faza incipientă. Motiv pentru care vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos cu mare atenție.

### Îngrijirea la domiciliu:

1. Păstrați legătura cu medicul de familie/pediatru;
2. Administrați lichide clare (supe, ceaiuri îndulcite, sucuri de fructe) pentru 12 ore apoi începeți să administrați orez, cereale sau cartofi.

**Sunați medicul de familie/pediatru sau reveniți imediat în Serviciul de Urgență dacă starea copilului se agravează sau dacă:**

1. Copilul nu poate să meargă cu ușurință sau se deplasează schiopătând;
2. Pășitul sau săritul îi cauzează o durere severă;
3. Abdomenul devine foarte destins;
4. Scaunul (materii fecale, caca) este cu sânge sau este negru;
5. Vărsătura este cu sânge, cu aspect verde sau cu aspect negru precum zațul de cafea;
6. Copilul urinează mai puțin decât în mod obișnuit sau are un scutec uscat timp de mai mult de 8 ore.

\_\_\_\_\_  
Semnătura de primire (pacient sau aparținător)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Nume și prenume (pacient sau aparținător)

