




21. ALGORITM DE EVALUARE ÎN URGENȚĂ A COPILULUI CU TRAUMATISM VERTEBRAL CERVICAL



Avertisment: Acest algoritm reprezintă o recomandare de abord al pacientului în urgență, dar nu înlocuiește judecata clinică impusă de specificul fiecărui caz



1

A. Mecanism traumatic semnificativ

- Pieton/biciclist lovit de mașină
- Pasager în autovehicul - accident rutier prin coliziune sau răsturnare
- Cădere de la peste 3 metri
- Lovit sau căzut de pe cal
- Proiectat de sau dintr-un autovehicul sau bicicletă
- Electrocutat
- Înecat
- Accident rutier în care cel puțin o victimă este în stare gravă sau a fost necesară descarcerarea
- Traumatism direct (arme de foc sau albe) sau indirect la nivel cervical
- Politraumatism
- Traumatism semnificativ la un nivel situat deasupra claviculelor (craniu, față, mandibulă)

B. Simptome și semne sugestive

- Durere spontană și/sau sensibilitate la palparea apofizelor spinoase cervicale, posttraumatic
- Limitarea mișcărilor de flexie/extensie, lateralitate, rotație datorită durerii
- Semne clinice de traumatism vertebral toracic, lombar
- Deficit neurologic acut, posttraumatic (parestezii și/sau slăbiciune musculară)
- Torticolis acut
- Hipotensiune și/sau bradicardie posttraumatică
- Orice leziune care produce durere sau disconfort și distrage atenția pacientului (fracturi)
- Status mental alterat (alcool, droguri, traumă)
- Imposibilitatea de a stabili un istoric al bolii, pacient găsit într-o situație care ar putea ridica suspiciunea de traumă, (la baza scârilor, sau pe stradă; fără martori) sau pacient găsit în apă, cu istoric sau probabilitate de submersie (înece)

C. Factori favorizanți

- Anomaliile de dezvoltare vertebrală și/sau laxitate ligamentară
- Sindrom Down
- Artrită reumatoidă
- Sindrom Grisel (subluxație non-traumatică atlanto-axială determinată de inflamația țesuturilor moi ca urmare a IACRS, abcese amigdalene/retrofaringiene, intervenții chirurgicale ORL)
- Mucopolizaharidoze (Sindrom Morquio- laxitate articulară)

2

Sunt îndeplinite TOATE condițiile următoare?

- Fără durere spontană sau la palparea coloanei cervicale
- Fără durere sau limitarea mișcărilor de rotație ușoară a capului la stânga și la dreapta
- Fără durere sau limitarea mișcărilor de flexie și extensie ușoară a capului
- Fără simptome/semne neurologice