



PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN  
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME

Unitatea/Compartimentul de Primiri Urgențe \_\_\_\_\_

Numele și prenumele pacientului \_\_\_\_\_

Medic curant \_\_\_\_\_

Data administrării tratamentului \_\_\_\_\_

Diagnostic \_\_\_\_\_

Tratament primit (laborator, radiografii, EKG, medicamente incluzând pe cele recomandate la plecare)

Ați fost tratat în Unitatea/Compartimentul de Primiri Urgențe (Serviciul de Urgență) astăzi și medicul care v-a consultat consideră că sunteți îndeajuns de bine pentru a fi lăsat acasă. Vă rugăm să fiți totuși conștient de faptul că, ocazional, în ciuda unui tratament corect administrat, starea pacientului se poate agrava. Din acest motiv:

**Dacă prezentați orice alt nou simptom sau dacă simptomele dumneavoastră durează mai mult decât ați fost informat de către medic, adresați-vă medicului de familie/specialist sau reveniți imediat în Serviciul de Urgență.**

Altfel, continuați să fiți urmărit de către medicul \_\_\_\_\_

în 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 zile / săptămâni / luni / după cum v-a fost indicat.

Vă rugăm să aduceți aceste recomandări la următoarea întâlnire cu medicul dumneavoastră de familie/specialist.

\_\_\_\_\_  
Semnătura de primire (pacient sau aparținător)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Nume și prenume (pacient sau aparținător)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești și prespitalicești de medicină de urgență prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul s-a derulat în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elvețian, reprezentat prin Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății, fiind implementat de către Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), în calitate de Agenție executivă.





## Recomandări pentru pacienți și aparținători

### CONVULSII FEBRILE

O convulsie febrilă este o convulsie care apare în contextul febrei la un copil mic. Sunt frecvente la copiii sub 5 ani. Chiar dacă copilul dezvoltă o convulsie febrilă, aceasta nu înseamnă că acesta are epilepsie. Deși o convulsie febrilă este dificil de urmărit de către părinți, de obicei nu reprezintă ceva grav. Convulsiile febrile nu afectează creierul sau inteligența copilului. Unii dintre copiii care au avut o convulsie febrilă în trecut, pot repeta convulsia la un nou episod de febră. NU se administrează medicamente care să prevină apariția convulsiilor febrile, dar sunt câteva măsuri de profilaxie care pot fi luate la domiciliu.

#### Îngrijirea la domiciliu:

1. Păstrați legătura cu medicul de familie/pediatru;
2. Controlul febrei este important: Paracetamol 15mg/kg la 4h. Pentru copiii care au mai mult de 6 luni, se poate folosi Ibuprofen 10mg/kg la fiecare 8h;
3. În timpul unei febre, nu îmbrăcați copilul în haine prea groase;
4. Încurajați copilul să bea multe lichide reci;
5. Dacă apare o convulsie:
  - păstrați-vă calmul;
  - întoarceți capul copilului pe o parte ca să permiteți scurgerea salivei săau a vărsăturii din gură;
  - NU puneți nimic în gură și NU forțați să țineți gura deschisă. NU există riscul să își înghită limba în timpul unei convulsii;
  - în cazul în care convulsia are o durată peste 3 minute sau există dificultate în respirație, apelați 112.

#### **Sunați la 112 sau reveniți în Serviciul de Urgență imediat dacă copilul nu este bine sau prezintă următoarele:**

1. Durere de cap severă, durere la nivelul gâtului;
2. Copilul devine apatic, somnolent sau confuz;
3. Copilul dezvoltă tulburări de mers, vorbit sau mâncat;
4. Copilul dezvoltă altă convulsie în următoarele 24h;
5. Starea copilului se agravează sau dezvoltă orice alte probleme care sunt îngrijorătoare pentru dumneavoastră.

Semnătura de primire (pacient sau aparținător)

Data

Nume și prenume (pacient sau aparținător)

